

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА № 5-2026



Исх.: № ____ от 19 июня 2026 год

Исп. ведущий агроном по защите растений Мухаметгалеева М.С.

Адрес: 664013, г. Иркутск, ул. Томсона, д. 3, тел./факс 47-92-27

E-mail: rsc_irk@mail.ru



Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области сообщает, о отрождении гусениц капустной моли. Капустная моль – опасный вредитель рапса и других крестоцветных культур.

Вред наносят гусеницы всех возрастов. Отродившаяся гусеница почти без пигментации, голова тёмно-коричневая, Личинка линяет 4-5 раз. Окраска гусениц старших возрастов варьирует от зелёного до тёмно-коричневого. В первое время гусеницы скелетируют нижнюю сторону листа. Позже выгрызают округлые «окна», оставляя нетронутой верхнюю кожицу листа. Через 16-25 дней после отрождения гусеница заканчивает питание.



Бабочка капустной моли до 14 мм в длину, серо-коричневого или тёмно-бурого цвета. На передних крыльях есть волнистая белая или желтоватая полоска. Бабочка расселяется, спаривается и откладывает овальные яйца на нижнюю сторону или черешок листа.

Массовому распространению вредителя способствуют повышенный температурный режим в сочетании с дефицитом осадков, а так же рост посевных площадей крестоцветных культур, нарушение севооборота.

Рекомендуем установить постоянные наблюдения за состоянием посадок и посевов. Отмечать даты появления вредителя на полях и учитывать сумму эффективных температур, чтобы спрогнозировать массовое распространение и развитие вредителя на посевах и провести профилактические и защитные мероприятия.

ЭПВ на крестоцветных культурах (капуста, рапс, редис) – 2-5 гусеницы на растение или 10,0% заселённых растений.

В случае обнаружения вредителя с численностью превышающей ЭПВ, необходимо провести инсектицидные обработки препаратами согласно «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ 2026 года». При повторных обработках в течение вегетационного периода желательно использовать инсектициды с другими действующими веществами во избежание появления резистентности вредителя.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов, производственных помещений) в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории Российской Федерации" и с гигиеническими требованиями СанПиН 2.1.3684.21 (глава 12). Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности!